

روش مصرف مناسب این دارو:

همیشه این دارو را طبق دستور پزشک خود مصرف نمایید و در مورد هر گونه شبهه با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید. این دارو فقط برای مصرف خارجی (بوسیت) می‌باشد. ژل را به مقادیر توصیه شده و در نوافی مبتلا (شامل بیشانی، چانه، بیضی و گونه‌ها) استفاده کنید و از تماش آن با پیشنهادها، لبها و داخل بینی خودداری نمایید. از تماش دارو با زخم ایام و با خراشیدگی خودداری کردد. در موردی که از سایر فرآورده‌های موضوعی مثل لوازم آرایش استفاده می‌کنید اجازه دهد ژل کاملاً خشک شود سپس این فرآورده را بکار ببرید.

دوز فراموش شده:

اگر مصرف سک دوز از دارو را فراموش کردید، قرمی پوست صورت شما در همان روز کاهش نمی‌یابد و در صورت فراموشی، دوز روز بعد را دوباره تکیند. زیرا ریسک برخورد عوارض جانبی را فراموش می‌دهد.

صرف بیش از حد:

صرف موضعی بیش از حد توصیه شده ریسک برخورد عوارض جانبی (مانند التهاب پوست، سرگیجه، خواب‌گذاری و افت فشار خون) را افزایش می‌دهد و در صورت برخورد مشکلات نامناسب داده با پزشک خود مشورت نمایید. اگر سرمه‌دانداری از این دارو را بلعیدید، سریعاً به پزشک یا مرکز درمانی مراجعه نمایید. عالم آن شامل افت فشار خون، استفراغ، خستگی، خواب‌گذاری، کاهش و یا پیش‌نمایش تربیان قلب، تنگی مردهک چشم، مشکلات تنفسی، سیستمی، کاهش دامای بدن و تنشتنی می‌باشد. در صورت برخورد این علائم از راندگی و کارهایی که نیاز به هوشواری کامل درآمد احتساب گردد.

هشدارها و اختیارات:

- از تماش دارو با پیشنهادها، سطوح مخاطبی بینی و نواحی آسیب دیده مانند بردگی، خراشیدگی و یا زخم باز خودداری کردد.
- کمتر از یک ششم مصرف کنندگان طی دهفته اول ممکن است دچار تشدید عالمند گردند. که با طقطع مصرف عالمند تخفیف می‌اید. برای احتساب این پیش‌نمایش روز اویل بر روی قسمت کوچکی از مصرف تسبیت کنید و در صورت تحمل دوز دارو را افزایش دهید.
- در صورت برخورد پاکش و انتهای بودن این دارو را قطع و با پزشک خود مشورت نمایید.
- از مصرف دارو بدون دستور پزشک خودداری و نحوه مصرف نیز رعایت گردد.

عوارض جانبی:

هر دارو در کار انرات مخصوص مغایر دارویی یک سری اثرات ناخواسته می‌باشد. اگر چه تمام این اثرات ناخواسته در یک دارو برخور نمی‌کند اما در صورت برخورد عارض شکایت به پزشک خود مراجحه کنید. عوارض جانبی این دارو با آگاهی از آن و مشورت با پزشک این دارو پیش‌بینی و قابل ارتقای رفع می‌باشد. به خاطر داشتن بشایستگی عوارض داروهای بهر اثبات کمتر از عوارض عدم معرفت آنها می‌باشد.

- عوارض جانبی این دارو با شیوعه کمتر از یک به ۱۰ مورود: قرمی، گرم، رنگ بریدگی، خارش و یا احساس عسری شش در موضع
- عوارض جانبی باشیوه کمتر از یک به ۱۰۰ مورود: واکنشهای موضعی پوست، التهاب، ناراحتی پوستی، خشکی پوست، آنده، درد و تورم موضعی، سوزن سوزون شدن، کهیز، واکنشهای آنژروتیک، درماتیت تماسانی، سردرد، سرگیجه، اختناق بینی، ادم دور پشم و سرد دست و پا

در صورت قطع مصرف این عوارض پایستی نایاب شود و لی جانچه ادامه پیدا کرددند با پزشک و داروساز خود مشورت نمایید. در صورت برخورد هر گونه عارضه جدی خارج از لیست بالا پزشک یا داروساز خود را مطلع سازید. نیازی به کارهای از لیست عوارض ذکر شده در مورد این دارو نیست و لکن ترتیب مردم این دارو را بدون هیچ مشکلی مصرف می‌کنند.

شرطیت نگهداری:

دارو در دمای زیر ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری و از بیزدگی محافظت شود. همچنین دور از دید و دسترس اطفال قرار کنید. داروهای تاریخ مصرف گذشته یا داروهای را که دیگر نیاز دارای نگهداری نکنید.

دقت مرکز:

تهران - خ دکتر فاطمی غربی شماره ۹۵۲ کد پستی: ۱۴۱۱۸-۵۳۶۹۵
 تلفن رسیدگی به شکایات: ۰۱۳۱۸۸۳۶۱۹
 ایمیل: Complaints@sobhandarou.com

نام ازبکی: برمیونیدن

شکل دارویی: ژل موضعی

متلاعه و درک اطلاعات بیشتری در مورد این دارو نیاز دارد.

برخورد کردید یا به اطلاعات بیشتری در مورد این دارو نیاز دارد.

داروساز خود مشورت نماید.

قبل از استفاده از این دارو نکات زیر در نظر گرفته شود.

این دارو برای بیش از ۶۰ سال از مصرف خودداری نمایید. در تسمیه گیری برای مصرف آن در موارد مشابه

خطرات آن در مقابل فواید حاصل از مصرف دارو سنجیده شود.

بریمه‌وتاپ موارد ذیل باید در نظر گرفته شوند:

موارد منع مصرف:

در صورتیکه ساقه هر گونه واکنش غیرعادی ای آریزیک به ژل موضعی برمیونیدن پسر شکل دیگری از این دارو دارد. از مصرف دارو خودداری نمایید و همچنین در صورت داشتن حساسیت به هر ماده دیگری مانند گذاهار، مواد نگهدارنده یا رنگها، به پزشک خود اطاعه می‌گردید. مواد منع مصرف این دارو شامل مواد زیر می‌باشد:

• واکنش افزایش حساسیت به برمیونیدن یا سایر ترکیبات موجود در دارو

• کودکان زیر ۶ سال (آفایش ریسک برخورد عوارض جانبی)

• مصرف داروهای مورد استفاده در افسردگی و پارکینسون شامل مهار کننده های

موتوامن اکسیداز مانند سلتزین و موکوماید. ضد افسردگی های سه حلقه ای

مانند ایندی پرامین. ضد افسردگی های چهار حلقه ای مانند مایپرولین. میانسرين و میزان این

حاملگی:

مصرف این دارو در دوره شیر دهنی تومیه نشده است. زیرا اطلاعات کافی در مورد اثرات آن بر جینین انسان موجود نیست.

شیردهی:

مصرف دارو در دوره شیر دهنی تومیه نشده است. زیرا اطلاعات کافی در مورد ترشح دارو در شیر مادر موجود نیست.

اطفال:

ایمنی و اثربخشی دارو در کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال ثابت نشده است.

صرف همراه با سایر داروهای:

اگر همزنان با این دارو هر ۶۰ دقیقه مخصوصاً استکمپزشک‌ها مصرف داروهای پزشکی مانند برمیونیدن خود اطلاع دهند. مخصوصاً همچنین استکمپزشک‌ها مصرف داروهای پزشکی مانند برمیونیدن:

• داروهای ضد افسردگی

• داروهای آلام بخشن

• سایر داروهای موارد زیر بر سیستم اعصاب

• داروهای ضد التهاب غیر استرائوپنیدی

• داروهای بیوبیوتیک (مخدن)

• داروهای که هنده فشار خون مانند مهار کننده های گیرنده بتا (پروپرانولول، آنتولول، متیورولول و ...)

• کلیوکوپیدهای قلبی مانند دیگوکسین

• داروهایی مانند پرازوسین اثربخشی بر برمیونیدن (اثر بر گیرنده های آلفا سیستم اکریزیک) مانند پرازوسین

سایر بیماری ها:

حضور سایر بیماریها و مشکلات پزشکی می‌تواند مصرف برمیونیدن را تحت تأثیر قرار دهد. لذا مطمئن شوید که هر گونه مشکل پزشکی دیگر خود مخصوصاً مواد آمده در ذیل راهنمایی شوک خود اطلاع دهید:

• افسردگی و مشکلات قلبی و عروقی • سرگیجه و یا سندروم شوکر • بیماری رینود • خراشیدگی

خون‌وایسینه‌سکننده • خشکی‌دهان و یا سندروم شوکر • بیماری رینود • خراشیدگی

و یا زخم باز • پارداری • شیردهی