

کلونازپام - سبحان

نام ژئوپیک: کلونازپام-سبحان ۱ میلیگرم؛ فرق خطا در

کلونازپام-سبحان ۲ میلیگرم؛ فرق خطا در مقایل

مطالعه و درک اطلاعات ذیل برای شما بسیار سودمند می‌باشد. اگر به نکته‌ای نامفهوم برخورد کردید که این اطلاعات پیشتری در مورد این دارو نیاز دارید با پژوهش کیا داروساز خود مشورت کنید. قیل استفاده این دارو نکات ریز در نظر گرفته شود. این دارو برای بیماران فعلی شما تجویز گردیده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه آن به دیگران خودداری کنید. در تصمیم‌گیری برای مصرف یک دارو باید خطوات آن در مقابله فوابد جاصل از مصرف دارو مستحبه شود. در مورد کلونازپام موارد ذیل باید در نظر گرفته شوند:

موارد منع مصرف:

در صورتیکه سایقه هر گونه واکنش غیرعادی یا آلرژیک به داروی کلونازپام دارید و همچنین در صورت داشتن حساسیت به هر ماده دیگری مانند غذاها، مواد نگهدارنده یا رنگها، به پژوهش خود اطلاع دهید. موارد منع مصرف این دارو شامل موارد ذیل می‌باشد: **واکنش افزایش حساسیت به کلونازپام یا سایر محتویات دارو واکنش افزایش حساسیت به سایر بندوزایرین ها مانند دیازیام، فلوازپام، تامزام و ... مشکلات تنفسی یا بیماری ریوی-رضوی مشکلات کبدی شدید می‌باشند گروپس (این بیماری سبب ضعف عضلانی و خستگی زودرس عضلات می‌شود) مسندروگ آینه خواب (وقبه تنفسی هنگام خواب) گامک:**

در صورت بارداری و یا قصد باردار شدن قبل از مصرف دارو، با پژوهش کیا داروساز خود مشورت نمایید. مصرف این دارو در طی ماههای آخر بارداری، ممکن است سبب بروز افت دمای بدن، شسل آندها، مشکلات تنفسی، اختلال در بلع و علامت سوهمجهومت در نزد کرد.

شیردهی:

این دارو در شیر مادر ترشح می‌گردد، لذا در صورتیکه در دوره شیردهی به سر می‌برید، قبل از مصرف دارو با پژوهش کیا داروساز خود مشورت کنید.

صرف همراه با سایر داروهای:

اگر همانکه با این دارو، هر دارویی حتی داروهای بدون نسخه، گیاهی یا مکمل ویتمانی یا غذایی را مصرف می‌کنید با اخیر مصرف کرده اید، به پژوهش کیا داروساز اطلاع دهید. مخصوصاً مهم است که پژوهش شما از مصرف داروهای ریز اطلاع داشته باشد: داروهای شناخته شده مانند کاربامازین، هیاتوتین، فوارپیال، قیتوین، میکسیدون و الپرولات سدیم داروهای آرام پخش و خواب آور داروهای ضد اضطراب داروهای ضد درد (مذکور) داروهای بیهوده ای ریفارمین (انتی بیوتیک) سایدینین (صورت استفاده در سوزش سردد و زخم گوارشی) مدل سولفیرام داروهای ضد قارچ خوارکی مانند کوکنزاول و ایراکنزاول

سایر بیماریها:

حضر سایر بیماریها و مشکلات پژوهشی می‌تواند مصرف کلونازپام را تحت تأثیر قرار دهد. مطمئن شوید که هر گونه مشکل پژوهشی دیگر خود مخصوصاً موارد آمده در ذیل را به پژوهش خود اطلاع دهید:

بیماریهای ریوی-هاینزاپامی کلیوی-افسردگی-سایده خودکشی ممرگ وابستگان یا نزدیکان وابستگی به دارو، اکل یا مواد مخدر (آنکسی مفرزی یا نخاعی): این بیماری موجب لرزش، عدم تعامل، اختلال در تکلم (به شکل بیمهم و بربده بربده صحبت کردن) و حرکات سریع چشم می‌گردد. بورفیری (نوعی بیماری وراتی خون)

کلوكوم رازیه بسته:

روشن مصرف مناسب این دارو:

دارو را دقیقاً تلقیق دستور پژوهشکار مصرف نمایید و در صورت هر گونه شیوه با پژوهش کیا داروساز خود مشورت کنید. این دارو را یک لیوان آب میل نمایید. از مصرف داروهای تضعیف کننده سیستم عصبی و اکل یا این دارو خودداری نمایید. از قطع ناگهانی دارو بدون دستور پژوهش کیا خودداری نمایید. سالماندان ممکن است به مقادیر کمتری از دارو نیاز

داشته باشند. مقدار مصرف دارو در اطفال توسط پژوهش و بر اساس وزن تعیین می‌گردد.

دوز فراموش شده: اگر مصرف یک دوز از دارو را فراموش کردید، از مصرف دوز فراموش شده متصروف شده

و به رسم منظم قبلى برگردید. هرگز دوز دارو را به جهت جبران دوز فراموش شده دو برابر نکنید.

تصوف پیش از حاد:

در صورت مصرف اتفاقی پیش از مقدار توصیه شده سریعاً به پژوهش کیا مراکز درمانی مراجمه نمایید. مصرف پیش از حد دارو می‌تواند منجر به عوارض مانند خواب اولوگی، گیجی، کاهش سطح هوشیاری، ضعف عضلات، اشکال در نکلم، کاهش قشار خون، مشکلات تنفسی و در آنها کماید.

هشدارها و احتیاطات:

مصرف همان کلونازپام (مانند سایر بندوزایرین ها) با داروهای اپیوپتیدی (مخدرا) احتمال بروز دیزپرسون تتفصی (اکم شدن سرعت تنفس و کاهش تهییه گردیده برای انتقال اکسیژن به خون) را افزایش می‌دهد، لذا از مصرف آن بدون دستور پژوهش چنان خودداری نمایید.

این دارو ممکن است در موارد نارادی منجر به عوارض خطرناکی مانند افکار خودکشی و یا رفتارهای تهاجمی گردد، لذا در صورت بروز سریعاً به پژوهش خود متصورت کنید.

مصرف این دارو ممکن است سبب خواب اولوگی، سرگیجه، سیکی سر، لرزش یا عدم تهدای گردد، لذا در صورت بروز علائم از رانندگی و کار ای از ای از ای ای که نیاز به هوشیاری کامل دارند خودداری نمایید.

در صورتیکه سایقه عدم تحمل ترکیبات قندی مانند لاکتوز را دارید، حتماً قبل از مصرف دارو با پژوهش کیا داروساز خود متصورت کنید.

در صورتیکه وابستگی به اکل یا مواد مخدرا دارید، قبل از مصرف دارو با پژوهش خود مشورت کنید.

در صورتیکه وابستگی به اکل یا مواد مخدرا دارید، قبل از مصرف دارو با پژوهش افزایش را عدم تهدای گردد.

در صورت بروز واکنش افزایش حساسیت (مانند سایر داروهای) مصرف دارو را قطع نموده و به پژوهش کیا مراکز درمانی مراجمه نمایید.

عواراض جانبی:

هر دارو در کتاب اثرات مغاید خود دارای یک سری اثرات ناخواسته می‌باشد. اگر چه تمام این اثرات ناخواسته در یک فرد بروز نمی‌کند اما در صورت بروز هر مشکلی به پژوهش خود مراججه کنید. عوارض جانبی این دارو با اگاهی از آن و مشورت با پژوهش قابل پیش‌بینی و قابل رفع می‌باشد. به خاطر داشته باشید که عوارض داروها به مراری کمتر از عرضه اضطراب علمند مصرف اینها می‌باشد.

عواعراض جانبی شایعتر: خواب اولوگی، سرگیجه، سیکی سر، خستگی، افزایش برازق دهان، بی نظمی در حرکات، ضعف عضلات، عدم تعامل و تغیرات رفتاری.

عواعراض جانبی ناشایع: بی قراری، تحریک پذیری، هیجانات، رفتارهای تهاجمی، کاهش تمیرک، افسردگی، فراموشی، گیجی، افزایش ترشحات مجرای تنفسی و کند شدن عکس العمل.

نبایز به تکراری از لیست عوارض دکر شده در مورد این دارو نیست و اکنیست مردم این دارو را بدون هیچ مشکل مصرف می‌کنند.

عواعراض دیگری که در بیان اینه است ممکن است در برخی از بیماران بروز کنند لذا اگر متوجه عوارض جانبی دیگری شدید به پژوهش خود اطلاع دهید.

شروايط نگهداري:

در دهای ۳۰ درجه سانتیگراد، دور از نور و رطوبت و دور از دید و دسترس اطفال نگهداری شود.

دفتر مرکزی:

تهران، خیابان دکتر قاطعی غربی، شماره ۹۵، کد پستی ۱۴۱۸-۵۶۹۵

تلفن رسیدگی به شکایات: (۰۳۱۸۳۶۱۹)

Complaints@sobhandarou.com

ایمبل: Sobhan Darou
Rasht Industrial City-Iran
www.SobhanDarou.com

